

**Методы и кратность обследования детей и подростков  
при проведении профилактических медицинских осмотров  
в целях выявления туберкулеза в городе Москве**

Возраст и категория детей и подростков	Методы и кратность обследования		
	Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л <sup>1</sup>	Проба с АТР <sup>2</sup>	Рентгенография/флюорография грудной клетки цифровая <sup>3</sup>
От 2 до 12 месяцев	Однократно для отбора на вакцинацию БЦЖ-М детей, не привитых при рождении	Однократно при положительной реакции на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л, не связанной с вакцинацией БЦЖ-М, далее по назначению врача-фтизиатра в условиях медицинской организации или ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»	-
От 1 до 7 лет (включительно)	1 раз в год		-
От 1 до 7 лет (включительно) группы риска	2 раза в год		-
От 8 до 14 лет (включительно)	-	1 раз в год	-
От 8 до 14 лет (включительно) группы риска	-	2 раза в год	-
От 15 до 17 лет (включительно)	-	1 раз в год	1 раз в год в 15 и 17 лет, в 16 лет – лица, не обследованные в 15 лет
От 15 до 17 лет (включительно) группы риска	-	2 раза в год	1 раз в год

<sup>1</sup> Кожная проба с аллергеном туберкулезным очищенным в стандартном разведении

<sup>2</sup> Кожная проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (Диаскинтест®)

<sup>3</sup> Рентгенография/флюорография цифровая чередуется с иммунодиагностикой с интервалом 1 раз в 6 мес.

